

第2類医薬品

ハリソン®Fb50EG

ここから押して
開けてください

この箱に記載してある説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

- 4つの有効成分が筋肉や関節のつらい痛みにすぐれた効果を発揮します。
- 溶剤を使用しないホットメルト製法で、皮膚への刺激がほとんどありません。
- 伸縮性に優れた素材でどの部位にもピッタリフィットします。
- 貼りやすい構造の3ピースライナーを採用しています。

15.06

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)妊娠又は妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください

☎ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

使用期限

製造番号

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

【用法・用量】表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

△ 用法及び用量に関する注意

(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(3)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(4)汗をかいだり皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。

【成分・分量】膏体100g中
フェルビナク…5.0g ℓ-メントール…3.5g トコフェロール酢酸エステル…2.3g グリチルレチン酸…0.19g 添加物：スチレン・イソブレン・スチレンプロック共重合体、流動パラフィン、香料、その他4成分を含有する。

【内 容】7cm×10cm・・・32枚入

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります)。(4)品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管してください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売業者



共立薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1085番地

お問い合わせ先

お客さま相談室

0744-52-4741
受付時間9:00~17:00(土・日・祝を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
(独)医薬品医療機器総合機構 ☎0120-149-931(フリーダイヤル)