

14.02 △使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起ります)

1.次の人は使用しないでください

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)妊娠又は妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。

2.次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3.連続して2週間以上使用しないでください

■相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラクシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

使用期限

製造番号

この箱に記載してある説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

【効能・効果】

関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

△用法及び用量に関する注意

(1)定められた用法・用量を守ってください。
(2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
(3)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
(4)汗をかいり皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。

【成分・分量】

膏体100g中にフェルビナク5.0gを含有
添加物: l-メントール、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、流動パラフィン、香料、その他4成分を含有する。

【内 容】 7cm×10cm···24枚入

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります)。(4)品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管してください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製 造
販売業者



共立薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1085番地

◆お客さま相談室 ☎ 0744-52-4741

◆受付時間 9:00~17:00(土・日・祝を除く)