

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

湿疹・皮膚炎治療剤

ビスゲンコーチS

(クリーム剤)

第2類医薬品

ビスゲンコーチSは

湿疹、炎症を取り去る効果を発揮します。更にかゆみを静めるジフェンヒドラミン塩酸塩、リドカインを加えたクリーム剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

飲んだり、眼科用として使用しないで下さい。



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 今までに、薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 患部が広範囲の人
 - 湿潤やただれのひどい人
 - 医師の治療を受けている人
- 次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 使用后、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等

- 数日間、使用しても症状がよくならない場合

効 能 ・ 効 果

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用 法 ・ 用 量

1日1回～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのばして貼布します。

裏面もお読みください

用法・用量に関する注意

- (1) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は眼科医の診察を受けてください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 定められた用法、用量を守ってください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

有効成分(100g中)

成 分	含 量	は た ら き
硝 化 亜 鉛	10g	皮膚のたんぱく質と結合して被膜をつくるので、消炎作用、緩やかな防腐作用があります。また、浸出液の吸収及び分泌抑制により、創面などを乾燥させます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1g	ヒスタミンの作用を抑えて、かゆみなどの症状を抑える効果をあらわします。
リドカイン	1g	局所麻酔作用により、かゆみの伝わりを止め、かゆみを感じなくします。

添加物としてカルメロースナトリウム、ポリオキシエチレンアラキルエーテル・ステアリルアルコール混合物、ポリソルベート60、エデト酸ナトリウム水和物、クエン酸ナトリウム水和物、ハッカ油、ℓ-メントール、パラベンを使用しています。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (2) 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓にして保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)

〈お問い合わせ先〉 (1) 購入した薬局・薬店
(2) 協和新薬株式会社
住所：埼玉県草加市小山1-28-8
電話：048-942-1445
〔受付時間：9時～17時まで(土・日・祝日を除く)〕

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

〈製造販売元〉 協和新薬株式会社
埼玉県草加市小山1-28-8