

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 鎮痒消炎薬

虫さされ・かゆみに

# リドバートQゲル

第②類医薬品

主成分のプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルは、アンテドラッグといわれる種類のステロイド剤です。アンテドラッグとは、皮膚表面の患部で効果を発揮し、体内に吸収されると低活性となる薬剤のことです。湿疹、じんましん等の炎症をしづめるプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル、グリチルリチン酸二カリウムに、かゆみを抑えるジフェンヒドラミン塩酸塩、クロタミトン、リドカインを配合しています。パンテノールは肌の修復を促進させます。イソプロピルメチルフェノールは、殺菌効果があります。I-メントール、dl-カンフルは、清涼感を与えかゆみを抑えます。本剤は、べたつかない透明なゲルクリームです。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)

1. 次の部位には使用しないで下さい

- (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2)創傷面、目の周囲、粘膜等。

2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい

3. 長期連用しないで下さい



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が広範囲の人。
- (5)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

### 【効能・効果】

虫さされ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも

裏面もお読みください。



## 【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布して下さい。



## （用法・用量に関する注意）

- (1)定められた用法・用量を守って下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4)外用にのみ使用して下さい。

●チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出して下さい。  
(①→②)



●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。  
折り曲げないで下さい。 折りたたまないで下さい。



## 【成分・分量】 (100g中)

成 分	分 量	効 き
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル (アンテドラッグステロイド剤 PVA)	0.15g	湿疹、じんましん等の炎症をしづめます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0 g	抗ヒスタミン作用により、かゆみの発生を抑えます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.3 g	炎症をしづめます。
クロタミトン	5.0 g	かゆみを抑えます。
リドカイン	2.0 g	局所麻酔作用により、かゆみをすばやく抑えます。
パンテノール	1.0 g	はれ、赤みをおびた肌の修復を促進させます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g	殺菌効果があります。
I-メントール	3.5 g	
dl-カンフル	1.0 g	清涼感を与え、かゆみを抑えます。

添加物として、1,3-ブチレングリコール、ヒプロメロース、ヒドロキシエチルセルロース、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、エタノール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物を含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4)火気に近づけないで下さい。また、使用後は火中に投じないで下さい。
- (5)揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかりと締めて下さい。
- (6)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないで下さい。
- (7)メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化織の衣類、プラスチック類、皮革製品、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意して下さい。
- (8)使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用して下さい。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 058-246-8771

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

**火気厳禁**  
第二石油類 危険等級Ⅲ  
(クロタミトン、エタノール)

製造販売元 **協和薬品工業株式会社**  
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号