



製造番号
4 962307 090682

M004

汗などによるかゆみ、しっしん、かざれに効く 20g



テシトンHRクリーム

さらさらしたべたつかないクリームタイプ

第②類医薬品 皮膚疾患治療薬

第②類医薬品 20g

テシトンHRクリーム

さらさらしたべたつかないクリームタイプ

3つの作用で
がまんできない症状を抑えます。

- 殺菌作用
- かゆみ止め作用
- 消炎作用



A3203

あせも かざれ

かざれに

がまんできない

皮膚患部で > 効き 体内では低活性

殺菌 殺菌 殺菌

あせも かざれ

●省資源化のため、ケースが添付文書を兼ねています。ご使用に際して、このケースの記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 テシトンHRクリーム 第②類医薬品

効能・効果
湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

用法・用量に関する注意

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。(3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分・分量

(100g中) プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA) 0.15g、ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g、l-メントール 3.5g、dl-カンフル 1.0g、クロタミトン 5.0g、イソプロピルメチルフェエノール 0.1g、添加物として、パルミチン酸イソプロピル、ワセリン、ペヘニルアルコール、ステアリルアルコール、セタノール、モノステアリン酸グリセリン、セトマロゴール、ジソプロパノールアミン、ジメチルポリシロキサン、パラベン、ジブチルヒドロキソールエンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。(2)小児の手の届かないところに保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります。)(4)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。(5)メガネ、時計、アクセサリー類、繊維製品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。(6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

本剤について、何かお買付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

消費生活相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室 ☎058-246-8771

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

△ 使用上の注意

- ⊗ してはいけないこと
- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし、たむし等又は化膿している患部。
 - (2) 目の周囲、粘膜等。
 2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
 3. 長期連用しないでください

- ※ 相談すること
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やたれのひどい人。
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし、たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

テシトンHRクリーム 第②類医薬品

テシトンHRクリーム 第②類医薬品

