

収れん消炎剤
日本薬局方
第2類医薬品
フェノール・亜鉛華リニメント

Phenol and Zinc Oxide Liniment
フェノール・亜鉛華リニメント「コザカイP」**50g**



製造販売元 **小塚製薬株式会社**
東京都墨田区両国4-36-9
F9E 電話:03-3631-1495

2012年4月改訂（記載要領変更に伴う改訂等）
ご使用前に際しては、この説明文書を必ずお読み下さい。

使用上の注意

決してはいけないこと 【守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる。】次の部位には使用しないこと。 損傷皮膚及び粘膜、目のまわり

相談すること 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)患部が広範囲の人(4)湿潤やただれのひどい人
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ等

3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果 湿疹・皮膚炎、あせも、かぶれ、虫さされ
用法・用量 1日数回、患部に適量を塗擦する。

＜用法・用量に関連する注意＞

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流すこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。(3)外用にのみ使用し、内服しないこと。

成 分 本品50g中、液状フェノール1.1mL、酸化亜鉛5gを含有する。添加物としてトラガント末、カルメロースナトリウム、グリセリンを含有する。

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光を避け、涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがある。)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

シュリンク包装品

使用期限:
製造番号:

