

収れん消炎剤 第3類医薬品
日本薬局方

亜鉛華軟膏

(酸化亜鉛軟膏)

Zinc Oxide Ointment
亜鉛華軟膏「コザカイ・P」

50g



製造販売元 小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-9
F9E 電話:03-3631-1495

2012年4月改訂(記載要領変更に伴う改訂等)
この説明書は、本剤の使用前に必ずお読み下さい。

使用上の注意

❌ **してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる。]・次の部位には使用しないこと。 重度又は広範囲のやけど

⚠️ **相談すること** 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)患部が広範囲の人(4)湿潤やただれのひどい人

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ等

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果 湿疹・皮膚炎、やけどによる潮紅、かぶれ、あせも、ただれ

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布するか、またはガーゼ、布などに塗布し患部にあてる。

＜用法・用量に関連する注意＞(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流すこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。(3)外用にのみ使用し、内服しないこと。

成 分 本品50g中、酸化亜鉛10gを含有する。添加物として、流動パラフィン、サラシミツロウ、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、白色ワセリンを含有する。

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光を避け、涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがある。)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931 使用期限:

シュリンク包装品

製造番号:

