

第2類医薬品 鎮痒消炎剤

第2類医薬品

鎮痒消炎剤

第2類医薬品

鎮痒消炎剤

PILESKIT LOTION
パイルスキット液

PILESKIT LOTION
パイルスキット液

PILESKIT LOTION
パイルスキット液

かゆみ
虫さされ

かゆみ
虫さされ



かゆみ
虫さされ

大容量
80mL CAINZ

すばやく効いてしっかり治す

大容量
80mL CAINZ

発売元
東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号
製造販売元
三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、ご購入めいたお店または下記までご連絡いたします。ご返信いたします。

三友薬品株式会社
03-3899-9333

製造
番号

使用
期限



ジフェンヒドラミン塩酸塩
リドカイン

2つの
かゆみ止め成分の
W効果。

大容量

CAINZ 80mL

CAINZ 80mL
PILESKIT
LOTION
パイルスキット液
かゆみ
虫さされ
鎮痒消炎剤
第2類医薬品

成分・分量100mL中

ジフェンヒドラミン塩酸塩 ……2.0g
リドカイン ……0.5g
l-メントール ……3.0g
dl-カンフル ……2.0g
添加物:クエン酸水和物、ヒドロキシ
プロピルセルロース、エタノール、ア
ズビン酸ジイソプロピル、ハアセチ
ルしよ糖、アンモニア

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気のない涼しい所に密栓して保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください
- (3)他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になります)
- (4)火気に近づけないでください
- (5)メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、繊維の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

※使用の際は薬液をスポンジに十分浸透させてから塗布してください

ここから
開けてください

ご使用に際し、外箱に記載の説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 パイルスキット液 第2類医薬品

⚠️ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果

かゆみ、虫さされ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください
- (4) 定められた用法・用量を守ってください

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

