

ここから
開けてください

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

[使用上の注意]

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起
こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症
状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こ
したことがある人。(3) 妊婦または妊娠してい
ると思われる人。(4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 皮ふの弱い部位(顔、
頭、わきの下等)。(3) 淋疹、かぶれ、傷口。(4) み
ずむしむたる等または化膿している部位。

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤
を併用しないでください

4. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販
売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けていた人。(2) 葉などによ
りアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)
次の医薬品の投与を受けていた人。ニューキノロ
ン系抗酸剤

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用
の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この
説明文書を持って医師、薬剤師または登録販
売者に相談してください

関係部位 症 状

皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、 刺激感、熱感、皮ふのあれ、落屑(フケ、 アカ)のような皮ふのはがれ)、水疱、色 素沈着
-----	---

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称 症 状

ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じん ましん、声のかすれ、くしゃみ、のど のかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混 濁等があらわれます。
--------------------	--

接触皮ふ 炎、光線過 敏症	塗擦部に強いかゆみを伴う発疹・発 赤はれ、刺激感、水疱、ただれ等の 激しい皮ふ炎症や色素沈着、白斑 があらわれ、中には発疹・発赤、かゆ み等の症状が全身に広がることがあ ります。また、日光が当たった部位に 症状があらわれたり、悪化するこ ことがあります。
---------------------	--

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合
は使用を中止し、この説明文書を持って医師、
薬剤師または登録販売者に相談してください

[成分・分量] 1g中

ジクロフェナクナトリウム…10mg
添加物:ヒドロキシプロビルセ
ルロース、ヒドロキシエチルセ
ルロース、ポリオキシエチレン
ポリオキシプロピレンセチル
エーテル、ビロ亜硫酸Na、イソ
プロパノール、pH調節剤、2-
メントール

[保管及び取り扱い上の注意]

(1) 直射日光の当たらない涼
しい所に密栓して保管してくだ
さい。(2) 小児の手の届かな
い所に保管してください。(3) 火氣に近づけないでください。
(4) メガネ、時計、アクセサリー
等の金属類、化織の衣類、プラ
スチック類、床や家具などの塗
装面等に付着すると変質する
ことがありますので、付着しな
いよう注意してください。(5) 他
の容器に入れかねいでくだ
さい。(誤用の原因になったり
品質が変わることがあります)
(6) 使用期限を過ぎた製品
は使用しないでください。な
お、使用期限内であっても、開
封後はなるべく速やかに使
用してください。

伸びが良く患部に浸透

ゲルタイプ

ジクペタスエグル 50g

痛みに
効く!



ジクロフェナ
クナトリウム 配合

第2類医薬品

経皮鎮痛消炎剤

【効能・効果】

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・首手の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫

【用法・用量】

1・3日~4回適量を患部に塗
擦してください。ただし、塗擦
部位をラップフィルム等の通
気性の悪いもので覆わないで
ください。なお、本成分を含
む他の外用剤を併用しないで
ください。
・15歳未満の小児は使用しな
いでください。

【用法・用量にに関する注意】

(1) 定められた用法・用量をお
守りください。(2) 本剤は、痛
みやはれ等の原因になつて
いる病気を治療するのではなく、
痛みやはれ等の症状のみを治
療する薬剤ですので、症状が
ある場合だけ使用してください。
(3) 本剤は外用にのみ使
用し、内服しないでください。
(4) 1週間あたり50gを超えて
使用しないでください。(5)
目に入らないよう注意してく
ださい。万一、目に入った場合
には、すぐに水またはぬるま
湯で洗ってください。なお、症
状が重い場合には、眼科医の
診療を受けてください。(6)
使用部位に他の外用剤を併
用しないでください。(7) 通
気性の悪いものの(ラップフィ
ルム、矯正ベルト等)で使用部
位を覆い、密封状態にしないで
ください。(8) 使用後は手を
洗ってください。

薬局
販賣



4 944661 135052