ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。
(3)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください
(1)目の周囲、粘膜等。(2)しっしん、かぶれ、傷口。
(3)みずむし・たむし等または化膿している患部。

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください

4. 連続して2週間以上使用しないでください
(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)妊娠または妊娠していると思われる人。　(4)高齢者。
(5)次の診断を受けた人。　気管支ぜんそく

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症　状
皮　ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症　状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
下痢・軟便

4. 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(他の疾患の可能性があります)

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

○表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。
○15歳未満の小児は使用しないでください。
<用法・用量に関連する注意>
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
(3)1日あたり2枚を超えて使用しないでください。
(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
(5)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1〜2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

製造番号

使用期限

成分・分量(膏体100g中)

	1枚10cm×14cm、膏体量10g

ロキソプロフェンナトリウム水和物……1.134g(無水物として1g)
添加物:グリセリン、D-ソルビトール、クロタミトン、ポリソルベート80、ハッカ油、酸化チタン、カルメロースナトリウム、タルク、ケイ酸アルミニウム酸Mg、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、pH調節剤、エデト酸Na水和物、その他1成分

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
(4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めて保管してください。
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元 ラクール薬品販売株式会社
製造販売元 三友薬品株式会社 東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

〈お問い合わせ先〉
本製品に関するお問い合わせは、下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。
ラクール薬品販売株式会社
フリーダイヤル　0120-86-8998

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

紙

4 987435 507013

肩こりに伴う肩の痛み
腰痛・筋肉痛
1日1回
24時間
効果が持続
痛みに!
浸透して効く
ラクラクフィルム
全方向伸縮タイプ
1日2枚まで
ラクラクはがせてピタッと貼れる
7枚入 (7枚×1袋) 1枚 10cm×14cm
保湿プラスチック
ヒリヒリテクノロジー
物 侵害 防御
ロキプロフェン パップ 冷感 7枚入 (7枚×1袋) 1枚 10cm×14cm
RAKOOL 第2類医薬品
鎮痛消炎薬 第2類医薬品
ロキプロフェン パップ 冷感
ロキソプロフェンナトリウム水和物配合
RAKOOL 第2類医薬品
A