

3.5~6日間使用する場合は、必ず医師の診療を受けたうえで、この説明文書を

3.5~6日間使用する場合は、必ず医師の診療を受けたうえで、この説明文書を

皮膚部位	頭部・頸部・四肢・足部
症候	発赤・発熱・発痒・発疹

製本部

会社名

販売元

看護師が医師と連携して

看護師が医師と連携して

看護師が医師と連携して

看護師が医師と連携して

看護師が医師と連携して

看護師が医師と連携して

看護師が医師と連携して

看護師が医師と連携して

看護師が医師と連携して

開封後はなるべく早く使用してください。



【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 使用期限(箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

お子様が誤ってピナクルSを口に入れてしまった場合

- 口の周りや口の中についたクリームをできるだけふき取ってください。
- 少量なめた程度では影響はありませんが、量が多いと眠気があらわれることがあります。
- しばらく様子を見て、呼吸異常などの症状がある場合はなるべく早く医師の診療を受けてください。

かゆみ、かぶれ
ムシさされに



ピナ
クールS
20g 第3類医薬品

セルフメディケーション

税控除対象

【効能・効果】湿疹、皮ふ炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布してください

【用法・用量】に関連する注意>

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後3箇月以上です。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- 定められた用法・用量を守ってください。

製造番号

使用期限