

切り口

切り口にそって手でゆっくり開封してください

切り口

開封後は、ファスナー部を合わせ保存してください

外用薬

セルフメディケーション

税 控除 対象

第2類医薬品 鎮痛消炎薬

ロキソプロフェンNa水和物配合

7枚入

ロキソプロフェンテープiQ

肩の痛み・腰痛・筋肉痛に


大判
10cm×14cm

貼り方

1 中央のフィルムをはがし患部にはります



2 残ったフィルムを片方ずつはがしてはってください



使用開始日:

年 月 日



4 987435 556158

切り口

切り口にそって手でゆっくり開封してください

切り口

開封後は、ファスナー部を合わせ保存してください

ご使用に際し、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意

× してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用しただけでじんましんが起これたことがある人。
(3) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) しっしん、かぶれ、傷口。
(3) あざむしれたむしめなどは化膿している患部。

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください

4. 連続して2週間以上使用しないでください

(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください。)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 妊婦または妊娠していると思われる人。(4) 高齢者。(5) 次の診断を受けた人。気管支ぜんそく

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください 下痢・軟便

4. 5〜6日経過後でも症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(他の疾患の可能性がります)

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

製造番号

使用期限

用法・用量

○表紙のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。

○15歳未満の小児は使用しないでください。

<用法・用量に際する注意>

(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 1日あたり2枚を超えて使用しないでください。(4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に裏の内側の皮膚の弱い箇所(1〜2cm角)の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分・分量(胃体100g中)

1枚10cm×14cm、胃体重量2g

ロキソプロフェンナトリウム水和物…5.67g(無水物として5g)
添加物: ①-メントール、ミリスチン酸イソプロピル、BHT、タルク、ステレン・イソブレン・ステレンブロックコポリマー、テルペン樹脂、流動パラフィン、その他2成分

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めて保管してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元
ラクル薬品販売株式会社製造販売元
三友薬品株式会社

東京都足立区鶴浜1丁目9番14号

お問い合わせ先

三友薬品株式会社 お客様相談窓口
03-3899-9333副作用報告書添付制度
電話: 0120-149-931