

2013年6月改訂
 (記載要領変更に伴う改訂)
 (*:効能・効果変更に伴う改訂)

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
 また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

虫さされ、かゆみに エルスカットD

第②類医薬品 鎮痒消炎薬

製品特長

- (1) ジフェンヒドラミン塩酸塩がかゆみを鎮め、デキサメタゾン酢酸エステルがはれ、赤みの原因となる炎症を抑えます。
- (2) l-メントールとdl-カンフルの爽やかな清涼感がかゆみを和らげます。
- (3) サラツとした液体ですので、使用感がよく、べとつきません。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
 - (2) 創傷面、目や目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮 膚 (患 部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、 化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】*


湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

(裏面もご覧ください。)

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

塗布容器の使い方



- ①キャップをはずして容器を逆さに持ち、スポンジ面を患部に軽く数回押し当ててください。
 - ②スポンジ面に薬液が十分にしみ込んだことを確認した後、患部に塗布してください。
- スポンジ面に薬液が十分にしみ込んでいないと、スポンジ面が破れるおそれがありますので注意してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量】 (100g中)

成分名	分量	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	25mg	はれ、赤みの原因となる炎症を抑えるステロイド成分です。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみを鎮めます。
グリチルレチン酸	0.2g	患部の炎症を鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用で、雑菌の繁殖を抑えます。
l-メントール	3.5g	爽やかな清涼感でかゆみを和らげます。
dl-カンフル	2.0g	

添加物としてエタノール、乳酸ナトリウム液を含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6)使用期限(ケース及び容器に表示)を過ぎた製品は使用しないでください。

【お問い合わせ先】

新新薬品工業株式会社 CHC事業部 お客様相談室

TEL: 076-435-0878

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

【製造販売元】新新薬品工業株式会社 〒930-2221 富山県富山市今市324番地