

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

あせも・かゆみ・ただれに

新アセボンS

第2類医薬品 鎮痒消炎剤

製品特長

- (1) かゆみ止め成分（ジフェンヒドラミン）と局所麻酔成分（リドカイン）が素早くかゆみを鎮めます。
- (2) 酸化亜鉛が患部を乾燥させ、サラッとした使用感を与えます。
- (3) 肌に優しい低刺激性、非ステロイド系の軟膏剤ですので、安心してご使用いただけます。

本剤にステロイド成分は配合されておりません。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

あせも、かゆみ、ただれ、湿疹、かぶれ、皮膚炎、じんましん、虫さされ、しもやけ

(裏面もご覧ください。)

【用法・用量】

1 日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量】（100 g 中）

成 分	分量	は た ら き
ジフェンヒドラミン	1 g	かゆみを鎮めます。
リドカイン	0.5 g	局所麻酔作用でかゆみを和らげます。
グリチルレチン酸	0.5 g	患部の炎症を鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g	殺菌作用で雑菌の繁殖を抑えます。
酸化亜鉛	35 g	患部を乾燥させ炎症の改善を促します。

添加物として、バレイショデンプン、マクロゴールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4)使用期限（ケース及びチューブに表示）を過ぎた製品は使用しないでください。

【お問い合わせ先】

新新薬品工業株式会社 お客様相談室

TEL：076-435-0878

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

【製造販売元】新新薬品工業株式会社 富山県富山市今市324番地