

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 頭皮などの湿疹、かぶれ、皮膚炎に

# デルマレチゾンHD<sup>®</sup>

第Ⅱ類医薬品 鎮痒消炎薬

### 製品特長

- (1) デルマレチゾンHDは頭皮などの湿疹、かぶれ、皮膚炎等を治すローションタイプのお薬です。
- (2) 患部で優れた抗炎症作用を発揮し、体内に吸収されると作用の弱い物質に変化するステロイド成分〔ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)〕を配合しております。
- (3) かゆみ止め成分と局所麻酔成分がすばやくかゆみを抑えます。
- (4) 患部に直接、無駄なく塗布できる容器を使用しています。

### ⚠ 使用上の注意



#### してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)
1. 次の部位には使用しないでください。
    - (1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
    - (2) 創傷面、目や目の周囲、粘膜（例えば、口唇等）
  2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
  3. 長期連用しないでください。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4) 患部が広範囲の人
  - (5) 潤潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

### 【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

(裏面もご覧ください。)

## 【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

### <液容器の使い方>



● 使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で押して中の空気を抜いてください。(暑い時期、温度の高い場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに内圧が高まり、薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです。)

● 患部に使用する時は容器を下向き又は斜めにして、患部に先端を軽く押しあてて塗布してください。(先端を患部からはなすと、薬液がでなくなります。)

### <用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

### 【成分・分量】(100g中)

成 分	分量	は た ら き
ブレドニゾロン吉草酸エステル 酢酸エステル	0.15 g	抗炎症作用により湿疹、かぶれ、皮膚炎等の症状を抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0 g	かゆみを鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	1.0 g	患部の炎症を鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.5 g	殺菌作用で雑菌の繁殖を抑えます。
リドカイン	2.0 g	局所麻酔作用でかゆみを和らげます。
メントール	1.0 g	爽やかな清涼感でかゆみを和らげます。

添加物として、エタノール、1,3-ブチレングリコール、ヒプロメロース、エデト酸ナトリウム水和物、乳酸を含有します。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化織の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 使用期限(ケース及び容器に表示)を過ぎた製品は使用しないでください。
- (7) 染めた髪につくと色落ちすることがあります。

### 【お問い合わせ先】

新新薬品工業株式会社 CHC事業部 お客様相談室

電話番号 076-435-0878

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

【製造販売元】新新薬品工業株式会社 富山県富山市今市324番地