



使用の前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

第2類医薬品

インドメタシンが筋肉痛・腰痛・関節痛の痛みをとる

経皮吸収型局所鎮痛消炎剤 **コナリス1.0%液**

コナリス1.0%液は、医療用と同じ1%配合のインドメタシンが局所のつらい痛みを直接取り除くとともに、3%配合の *l*-メントールの清涼感がさらに痛みをやわらげます。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1.次の人は使用しないこと

- (1) 今までにインドメタシン製剤によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 11才未満の小児。

2.次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等または化膿している患部。

3.長期間連用しないこと



相談すること

1.次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
- (3) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (4) 本人または家族がアレルギー体質の人。

2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書をもって医師または薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ

【用法・用量】

1日4回を限度として、適量を患部に塗布してください。

（用法・用量に関連する注意）

- (1) 11才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 1週間あたり50gを超えて使用しないこと。
- (5) 本剤塗布後の患部を、ラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと。
- (6) 定められた用法、用量を厳守すること。

【成分・分量】 100g中

インドメタシン 1g

l-メントール 3g

添加物：ラウロマクロゴール、1,3-ブチレングリコール、クエン酸Na、クエン酸、BHT、チオ硫酸Na、ヒドロキシプロピルセルロース、エタノール

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わるのを防ぐため。)
- (4) 容器が変形するおそれがあるので、車の中など高温になる場所に長時間放置しないこと。容器の変形により、スポンジ部分の脱落や、液もれがおこるおそれがあるので保管に注意すること。
- (5) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないこと。
- (6) 本剤が衣類や寝具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落とすこと。
- (7) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがあるので、付着しないように注意すること。
- (8) 火気に近づけないこと。
- (9) 使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないこと。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記へお願いいたします。

新生薬品株式会社 消費者相談窓口

☎ (076) 472-0361 (午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎ (06) 6351-2100 (代表) (午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)

発売元



KUDA 奥田製薬株式会社

大阪市北区天満1丁目4番5号

URL <http://www.okudaseiyaku.co.jp>

製造販売元

新生薬品株式会社

富山県中新川郡上市町森元町7-2