

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

あせも・かゆみに

# アセモフィット

第3類医薬品

## 製品の特徴

本剤は、酸化亜鉛（亜鉛華）を37%配合したお薬です。皮膚からの吸収に優れた抗ヒスタミン剤ジフェンヒドラミンと、局所麻酔剤アミノ安息香酸エチルがあせも等に伴う不快な症状を抑え、殺菌剤イソプロピルメチルフェノールが、細菌感染による症状の悪化を抑えます。そして、酸化亜鉛が、皮膚のたんぱく質と結合して皮膜を形成して皮膚を強化し、刺激物との接触から保護します。

## ⚠️ 使用上の注意

### 相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - ①医師の治療を受けている人
  - ②薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - ③湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、あせも、ただれ、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん、しもやけ

## 【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

## 【用法・用量に関連する注意】

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

（必ず裏面もお読みください）

- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。
- (4)寒冷時などに、中身がチューブから出にくい時は、手の中などでしばらく暖めてから使用してください。

### 【成分・分量】

成分名	分量 (1g中)	作用等
ジフェンヒドラミン	10mg	抗ヒスタミン作用により、発赤、かゆみ等の炎症症状を取り除きます。
アミノ安息香酸エチル	10mg	局所麻酔作用により、かゆみ、痛みを軽減します。
イソプロピルメチルフェノール	1mg	殺菌作用により、細菌感染による症状の悪化を防ぎます。
酸化亜鉛	370mg	皮膚に皮膜を形成し、刺激物から皮膚を保護します。

添加物：トリエタノールアミン、クエン酸、エデト酸Na、マクロゴール、バレイシヨデンブ

### 【成分・分量に関連する注意】

本剤を塗布後、白くなりますが、これは有効成分「酸化亜鉛」によるものです。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

新生薬品株式会社 消費者相談窓口  
 〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1  
 電話番号(076)472-0361  
 受付時間 9:00~17:00(土、日及び祝日を除く)

発売元 **松田医薬品株式会社**  
 高知県南国市左右山ヒル沢谷229-1

製造販売元 **新生薬品株式会社**  
 富山県中新川郡上市町横越16番1