

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

鎮痒消炎外用薬・副腎皮質ホルモン剤

ダイヤメルゾンクリームPV

製品の特徴

本剤は、皮膚表面の患部では高い効果を有し、体内に吸収されると活性の低い物質に分解される、治療効果と副作用低減の両立を意図して開発された新しいタイプの副腎皮質ホルモン剤（アンテドラッグ）を主成分とした鎮痒消炎外用薬です。

△使用上の注意

してはいけないこと 

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
- 次の部位には使用しないでください。
 - 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分
 - 顔面には、広範囲に使用しないでください。
 - 長期連用しないでください。

相談すること 

- 次的人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊娠又は妊娠していると思われる人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 患部が広範囲の人
 - 湿潤やただれのひどい人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

[効能・効果]

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんま疹

[用法・用量]

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

(必ず裏面もお読みください)

[用法・用量に関する注意]

- (1) 使用量は必要最小限にとどめてください。
- (2) 定められた用法、用量を守ってください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 本剤を塗擦後、その部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

[成分・分量]

成 分 名	分量 (1g中)	作 用 等
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	1.5mg	皮膚のかゆみや炎症等を抑えるアンテドラッグ。
クロタミトン	50.0mg	かゆみを特異的に抑える。
トコフェロール酢酸エステル	5.0mg	末梢の血流を改善し治療効果を高める。
イソプロピルメチルフェノール	1.0mg	殺菌効果により、二次感染による悪化を防止する。

添加物：ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、グリセリン、パラベン、カルボキシビニルポリマー、水酸化Na、塩酸
本剤は、有効成分による特有のにおいを有します。

[保管及び取り扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

新生薬品株式会社 消費者相談窓口

〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1

電話番号(076)472-0361 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 新生薬品株式会社
富山県中新川郡上市町横越16番1