

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎外用薬・副腎皮質ホルモン剤
虫さされ・かゆみ・しっしん

PVA フェナレーフ液

第②類医薬品

製品の特徴

- 本剤は、患部では高い活性を發揮しながら、役目を終えた後は低活性物質に分解するタイプの副腎皮質ホルモン剤（アンテドラッグ・ステロイド）ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル（PVA）を主成分とし、虫さされ、皮膚炎等、四季を通してのいろいろな皮膚の炎症症状に対して効果をあらわします。
- 基剤成分として配合のグリセリンが、かゆみを増強する皮膚の乾燥を抑えます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1)水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - (2)目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4)患部が広範囲の人
 - (5)湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

（必ず裏面もお読みください）

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)使用量は必要最小限にとどめてください。
- (2)定められた用法・用量を守ってください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)本剤塗布後、その部位を、ラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

【成分・分量】

成分名	分量(1g中)	作用等
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	1.5mg	いろいろな炎症症状に対して効果の出やすいアンテドラッグ・ステロイド。
クロタミトン	50.0mg	皮膚炎症の主症状である『かゆみ』を特異的に抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	5.0mg	末梢の血流を改善し治療効果を高めます。
イソプロピルメチルフェノール	1.0mg	殺菌作用により、細菌感染による症状の悪化を防ぎます。

添加物：トリエタノールアミン、クエン酸、BHT、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、エタノール、ヒドロキシプロピルセルロース

【成分に関連する注意】

- (1)エタノールを含有するため、塗布時にしみることがあります。
- (2)本剤の特有のにおいは有効成分によるものです。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して、立てて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)アルコール類などで変質・変色のおそれのあるもの(化学繊維、合成樹脂、家具、床等)への付着は避けてください。
- (6)使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、期限内であっても、開封後はなるべく速やかにご使用ください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

新生薬品株式会社 消費者相談窓口 [9:00~17:00(土、日、祝日を除く)]

〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1

電話番号 (076) 472-0361

発売元

明治薬品株式会社 富山県富山市三郷6番地

製造販売元

新生薬品株式会社 富山県中新川郡上市町横越16番1

SN0