

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

経皮吸収型鎮痛消炎剤

ダルトレンシン1.0%液

第2類医薬品

製品の特徴

- 非ステロイド性抗炎症薬インドメタシンが患部に直接浸透して、肩、腰、膝等のつらい痛みを直接取り除きます。
- l*-メントールの爽快な刺激感が、つらい痛みを和らげます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人
- (3) 11歳未満の小児

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

【用法・用量】

1日4回を限度として、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)1歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)1歳未満の小児に使用させないでください。
- (3)目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (6)本剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (7)定められた用法、用量を厳守してください。

【成分・分量及び作用】

成分名	分量(1g中)	作用等
インドメタシン	10mg	痛みを惹起するプロスタグランジンの生成を阻害して、直接痛みを抑えます。
l-メントール	30mg	清涼感を与えることにより痛みを抑えます。

添加物：ラウロマクロゴール、1,3-ブチレングリコール、クエン酸、クエン酸Na、BHT、チオ硫酸Na、ヒドロキシプロピルセルロース、エタノール

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6)メガネ、時計、アクセサリなどの金属類、アルコール類や油脂類などで変質・変色のおそれのあるもの(プラスチック製品、化学繊維、皮革、家具、床など)への本剤の付着は避けてください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

新生薬品株式会社 消費者相談窓口

〔受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)〕

〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1

電話番号 (076) 472-0361