

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名：フジアローDZクリーム（鎮痒消炎薬） 第2類医薬品

⚠️ 使用上の注意

相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 湿潤やただれのひどい人 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。[関係部位：症状] 皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ 3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用すること。

※本剤はカンジダ症の治療薬ではありません。

SN0

効能・効果

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。
(3) 外用にのみ使用すること。

成分・分量 <100g中>

ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	添加物：ミリスチン酸イソプロピル、オクチルドデカノール、ジメチルポリシロキサン、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、パルミチン酸デキストリン、グリセリン、硫酸Mg、香料 含有
リドカイン	1.0g	
イソプロピルメチルフェノール	0.5g	
グリチルレチン酸	0.5g	
トコフェロール酢酸エステル	1.0g	

開け口

お問い合わせ先
株式会社 富士薬品(学術室)
☎048-648-1118
9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元：新生薬品株式会社 発売元：株式会社 富士薬品
富山県中新川郡上市町横越16番1 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地