

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痒消炎薬

第②類医薬品

カユミック[®]アルファ軟膏

- * カユミックアルファ軟膏はすぐれた抗炎症作用があり、患部で良く効いて、体の中で低活性物質に変わる、従来のステロイド外用薬とは異なる製剤です。
- * 医療用薬剤から大衆用薬に転用された、安全性と有効性の両立を目的とされた「アンテドラッグ」の性質を持った外用剤です。
- * のびの良いゲル状の油脂性基剤ですので、患部がカサカサしている時、ジुकジुकしている時にも、ソフトな使用感の軟膏です。
- * 軟膏の硬さは、夏冬の気温差に関係なく一定し、快い使用感です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないで下さい。
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮 膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、 化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

しっしん、皮膚炎、かゆみ、かぶれ、ただれ、虫さされ、じんましん、あせも

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦して下さい。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。

(3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。

(4) 本剤は外用にのみ使用して下さい。

成分・分量

100g中	
成分	分量
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0.15g

添加物としてゲル化炭化水素を含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用して下さい。
- (5) 開封時に、基剤の一部が液状となってわずかに流れ出すことがありますが、品質の劣化ではありませんので、そのままご使用下さい。

日常のアドバイス

1. 患部を清潔にし、皮膚のよごれを落としてから塗って下さい。
2. 皮膚を刺激しないよう、低刺激性の石鹸を使い、やさしく洗って下さい。
3. 指先で強くこすらないよう、薄く塗って下さい。
4. 患部がジュクジュクしていたり、かさぶたがある場合、厚目に塗って下さい。かさぶたは無理にはがさないで下さい。
5. 患部をかきむしらないよう、爪は短く切って身の回りを清潔にしてください。
6. 皮膚病に注意したい食べ物
ソース・からし・わさび・アルコール類等刺激の強い食べ物。
コーヒー・チョコレート等甘い物。インスタント食品。
脂肪の取りすぎ。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先

本剤の使用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話 03-3952-0100
月～金曜日 9:00～17:00 (祝祭日を除く)



発売元
三宝製薬株式会社

東京都新宿区下落合2-3-18

製造販売元

新生薬品工業株式会社

富山県中新川郡上市町三日市22番地