

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

しっしん・皮膚炎・かぶれ・かゆみ・じんましん

ニッポーデルマP軟膏

ステロイド鎮痒消炎薬

◆ニッポーデルマP軟膏の特長

*主成分のプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルは患部すぐれた抗炎症作用を示し、体の中でより安全な低活性物質に変わります。有効性と安全性の両立を目的として医療用薬剤から大衆用薬に転用されたステロイド外用剤で「アンテドラッグ」と呼ばれています。

*のびのよいゲル状の基剤ですので、ソフトな使用感の軟膏です。

*夏冬の気温差に関係なく、軟膏の硬さは一定し快い使用感です。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1.次の部位には使用しないでください

- (1)水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2)目や目の周囲。

2.顔面には、広範囲に使用しないでください

3.長期連用しないでください



相談すること

1.次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が広範囲の人。
- (5)湿潤やただれのひどい人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量（100g中）

成 分	分 量
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0.15 g

添加物：基剤としてゲル化炭化水素を含有します。

(裏面につづく)

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

用法・用量


1日数回、適量を患部に塗擦してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 用法、用量を厳守してください。

※チューブ穴の開け方(右図を参照してください。)

キャップを逆にして、キャップの突起部をチューブの先に強く押し当てます。



保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべく速やかにご使用ください。
- (5) 開封時に、基剤の一部が液状となってわずかに流れ出ることがありますが、品質の劣化ではありませんので、そのままご使用ください。

包 装

10 g

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

発 売 元 日邦薬品工業株式会社 東京都渋谷区代々木3-46-16

お客様相談室 TEL 03(3370)7174(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

販 売 元 コーア製薬株式会社 横浜市港北区箕輪町2-17-5

※ 製造販売元 日本ゼトック株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2