

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痒消炎薬

ミナゼリー

第2類医薬品

ミナゼリーはさわやかな清涼感のあるかゆみ用の外用軟膏です。かゆいと神経がイライラし、患部を爪で引っかいて化膿をおこしたりします。ですから軽く考えずかゆみを早くとらなければなりません。このようなときミナゼリーは効果を発揮します。ミナゼリーは局所消炎作用を有するL-メントール、局所消炎・鎮痒作用を有するdl-カンフル、局所麻酔作用を有するリドカイン、抗ヒスタミン剤のジフェンヒドラミンを配合した透明なゼリー状の軟膏です。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果

かぶれ、湿しん、じんましん、皮膚炎、あせも、しもやけ、虫さされ、かゆみ、ただれ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布する。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。

成分・分量

100g中

成分	分量
l-メントール	4.00g
dl-カンフル	3.00g
リドカイン	2.00g
ジフェンヒドラミン	1.00g

添加物としてトリイソプロパノールアミン、プロピレンギリコール、エタノール、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 配置期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、配置期限内であっても、開封後はなるべく早く使用して下さい。
- (5) 本剤は揮発性ですので、キャップをあけて放置するとチューブの口の部分が白くなることがあります。白くなってしまふ効果に変わりはありませんが、使用後は密栓して下さい。
- (6) 火気に近づけないで下さい。
- (7) アルコールなどにとけるおそれのあるもの(めがねのわく、塗装道具など)にはつかないようにして下さい。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、販売業者又は下記までご連絡下さい。

日本ゼトック株式会社

電話 0120-886-440

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日を除く)