

この添付文書は、本剤をご使用になる前に必ずお読みください。
また、必要なときにいつでも読めるよう保管しておいてください。

第3類医薬品

消炎鎮痛外用薬

ねつ、はれ、いたみ、漢方しつぷ薬 **喜世効**

ねつ、はれ、いたみ、漢方しつぷ薬 **喜世効**は、消炎作用のある
オウバク、サンシシ等を配合した外用散剤です。

用時、必要量を取り、温湯か水を加え、練ってパップ剤にして使用し
ます。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと、現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやす
くなります。)

次の部位には使用しないでください。

1. 目の周囲、粘膜等
2. 湿疹、かぶれ、傷口

ⓘ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談して
ください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があ
るので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、
薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、
この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談
してください。

■ 効能・効果

神経痛・リウマチ・関節炎・肩のこり・肋膜炎・肺炎・筋肉痛
・腰痛・打ち身・くじきの消炎・鎮痛

■ 用法・用量

患部の大小に応じ、本剤の適量を茶碗かガラスの器に入れ、
温湯か水を加えて軟らかく練り、ヘラを用いてネル地のような
厚みの布に5ミリぐらいの厚さにのばし、患部によく密着
するように貼り、その上から包帯をしてください。

貼ってから8～10時間ぐらい効力が持続しますが、熱の程度
により乾ききらないうちに貼り替えてください。

入浴後に貼ると、より効果的です。

同封の「ヘラ」は、布に本剤をひろげるときにご利用ください。

<用法・用量に関連する注意>

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用
させてください。
2. 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場
合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、
症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
3. 外用にのみ使用してください。
4. 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

■ 成分・分量(100g中)

オウバク末(黄柏末)…………… 33 g
トウガラシ末(蕃椒末)…………… 5 g
サンシシ末(山梔子末)…………… 15 g
モクテンリョウ末(木天蓼末)…………… 15 g
カンキョウ末(乾姜末)…………… 10 g
dl-カンフル…………… 2 g
コメデンプン(米澱粉)…………… 20 g

<成分に関連する注意>

本剤の使用により、皮膚が青紫色に染まりますが、これは本剤
の成分が付着したためです。貼付中止後、10日ぐらいで自然に
元に戻ります。

■ 保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管して
ください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になつた
り、品質が変わることがあります。)

■ 問い合わせ先

チベン製薬株式会社 〒567-0073 大阪府茨木市西穂積町3番8号
電話：072-622-2509 FAX：072-625-6320

製造販売元 **チベン製薬株式会社**
大阪府茨木市西穂積町3番8号

KIY-PI-3