

この説明文書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読み下さい。

虫さされ・かゆみ・しっしん・じんましんに

グリチルレチン酸
ジフェンヒドラミン 配合

サーチ5[®]

鎮痒消炎薬

第3類医薬品

特長

サーチ5はすみやかに皮膚から吸収され、抗ヒスタミン作用を有するジフェンヒドラミンにより、しっしん・かぶれ・じんましん等のかゆみを止め、抗アレルギー作用による優れた抗炎症、鎮痒作用を有するグリチルレチン酸、皮膚の炎症を去り、痛みを鎮める *l*-メントール・*dl*-カンフルや鎮痛効果をもつサリチル酸メチルが配合されたクリームタイプのご家庭の外用鎮痒消炎薬です。また良質の親水性軟膏基剤を用いていますので、ぬったあとさらっとして簡単に水で洗い落せます。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3)湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

かゆみ、湿疹、かぶれ、虫さされ、じんましん、皮膚炎、あせも、ただれ、しもやけ

（裏面もお読み下さい）

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布又は塗擦して下さい。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法を守って下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4)外用にのみ使用して下さい。

成分・分量 100g中

ジフェンヒドラミン	1.0g
グリチルレチン酸	1.0g
l-メントール	5.0g
dl-カンフル	7.0g
サリチル酸メチル	3.0g

添加物としてセタノール、プロピレングリコール、ラウリル硫酸Na、ステアリン酸ソルビタン、ペヘン酸、ステアリン酸グリセリン、ヘキシルデカノール、ラウロマクロゴール、ステアリン酸ポリオキシルを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に高温になるような所(夏の車中など)には絶対に保管しないで下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)表示の期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、表示の期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用して下さい。

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 お客様相談室

電話 076(475) 2121

受付時間 9:00~16:00 (土、日、祝日を除く)



製造販売元

中新薬業株式会社

富山県滑川市上小泉504-2