

2014年1月記載要領変更に伴う改訂

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

あせもローション 桃の葉の薬

MOMONOHA MEDICAL LOTION

第2類医薬品

「桃の葉の薬」は昭和24年に根岸長三郎氏によって研究開発された商品で、その名前が示す通り“桃の葉”から主成分が抽出されています。本品はあせもや皮膚炎症に古くから用いられてきた民間療法「桃の葉の行水療法」をヒントに開発された医薬品です。

⚠ 使用上の注意

⊘ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜など
(2) 湿疹、かぶれ、傷口

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文章を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

- 衣類、カーペット等につきますと着色しますので、注意してご使用ください。
(衣類等についた場合は、すぐに水又は洗剤でよく洗い落としてください。)
- 薬剤が床や洗面台、家具、革製品、化粧品等に付着しないように注意してください。
(変質又は変色のおそれがあります。)

(裏面へ続く)

【効能・効果】

あせも、ただれ、かぶれ、かゆみ、虫さされ、吹出物、にきび、かみそりまけ

【用法・用量】

1日1～数回適量を患部に塗布するか、ガーゼ等にのばして貼付してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量とその働き】 103.55g 中

成分	分量	働き
桃の葉 キョウニン	100g	ヒフ炎、あせも、しっしん等の炎症や かゆみを抑えます。
硫酸アルミニウムカリウム	2.0g	血行を改善し、炎症を抑えます。
レゾルシン	0.5g	殺菌作用により化膿を防止します。

添加物:エタノール、グリセリン、サリチル酸メチル、ユーカリ油

＜成分に関連する注意＞

本剤は生薬が配合されていますので、まれに沈澱を生じることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 品質保持のため、使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、キャップを一度開けた後は、できるだけ早めに使用してください。

【内容量】 100g

【お問い合わせ先】

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。

千金丹ケアーズ株式会社 お客様相談室

電話：(087) 874-5500 受付時間：9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

 千金丹ケアーズ株式会社
香川県高松市国分寺町福家甲154番地2