

開封口

ご使用に際して、この箱の説明を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

外用鎮痛消炎薬
ラウマーFE液

第2類医薬品

△ 使用上の注意

× してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口又は化膿している患部。

※ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれなど

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

成分・分量 (100mL中)
フェルビナク……………3.0g
ℓ-メントール……………3.0g
添加物としてBHT、エタノール、クエン酸、ジソプロパノールアミン、マクロゴール、グリチルレチン酸、ヒプロメロースを含有します。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

1日2～4回、適量を患部に塗布してください。

(用法・用量に関連する注意)

(1) 用法及び用量を厳守してください。(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。(3) 外用にのみ使用してください。(4) 薬剤塗布後の患部を、ラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないでください。(5) 薬液をスポンジ面に十分に浸透させて使用してください。薬液がスポンジ面に十分浸透していないと、スポンジ面が破れるおそれがあります。

セルメディケーション

税 控除 対象

患部に浸透し、つらい

痛み

を抑える 肩の痛み・腰痛
筋肉痛・関節痛

フェルビナク

3.0%

ロコキタイプ

【第2類医薬品】
痛みを抑える
フェルビナク3.0%
ラウマーFE液
外用鎮痛消炎薬
100mL

ラウマーFE液

第2類医薬品

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して立てて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかりしめてください。(4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。)(5) 火気に近づけないでください。(6) 火の中に投じないでください。(7) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。(8) メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、繊維の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面などに付着すると変質することがあるので、付着しないように注意してください。(9) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内でも化膿するべく速やかに使用してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いします。
万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
(ただし、土、日、祝日を除きます)

発売元
日野薬品工業株式会社
滋賀県蒲生郡日野町上野田119
製造販売元
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

内容量 100mL
火気厳禁 第二石油類
(エタノール、ジソプロパノールアミン)
水溶性 危険等級Ⅲ

