



製造番号
使用期限

第②類医薬品 ラカナウPVA8クリーム


体内で低活性になるステロイド治療薬

湿疹、皮膚炎、かぶれ、虫さされ、じんましん

プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)・・・0.15g 配合 (100g中)

小児に注意
妊婦に注意

口内用



鎮痒消炎薬

クリームタイプ

このような症状に▶



かゆくてつらい
湿疹、皮膚炎に



省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。
〈鎮痒消炎薬〉 販売名:ラカナウPVA8クリーム

△ 使用上の注意

× してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の部位には使用しないでください
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
(2) 目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください

★ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

第②類医薬品

【効能・効果】
湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん
【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗擦してください。

【用法・用量に関連する注意】

(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】

(100g中) プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA) 0.15g、グリチルレチン酸0.5g、ジフェニヒドラミン塩酸塩2.0g、クロタミトン5.0g、リドカイン2.0g、トコフェロール酢酸エステル1.0g、アラントイン0.2g、イソプロピルメチルフェノール0.1g、添加物として、セトステアリルアルコール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、モノステアリン酸グリセリル、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、エデットNa、パラベン、リン酸、水酸化Na、ジブチルヒドロキシトルエンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
(4) 使用期限(箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五ヶ1169-142

お問い合わせ先
万協製薬株式会社【お客様相談室】
電 話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

PVA配合

かゆくてつらい
湿疹、皮膚炎に

PVA配合

湿疹、皮膚炎に
かゆくてつらい

A2408

M019