

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

03

鎮痒消炎薬

虫さされ・かゆみに


第②類医薬品

アプレインEX11液

- ◎アプレインEX11液は、アンテドラッグステロイドを配合したお薬で、11の成分が虫さされのしつこいかゆみや湿疹、かぶれなどにしっかりと効きます。
- ◎アンテドラッグステロイドとは
ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルは、患部で優れた抗炎症作用を発揮しその後、体内に吸収されると作用の弱い物質に分解される特性があります。

容器の使用法

使用前に容器の口を上に向けて、手の指でスポンジ中央部を数回空押しして中の空気を抜いてください。
(暑い時期、高温の場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに、容器内の圧力が高まり薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです)



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
(2) 創傷面、目の周囲、口唇、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

虫さされ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも

裏面もお読みください。

【用法・用量】

1 日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) キャップをとりはずし、スポンジ部分を肌に数回軽く押し当てて、スポンジに薬液をしみ込ませてから使用してください。スポンジ面に薬液が十分しみ込んでいない状態で使用すると、スポンジが破損する場合があります。
○同じ部位に他の軟膏・クリーム剤を併用するとスポンジを傷めることがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 塗布後、その部位をラップフィルム、絆創膏などの通気性の悪いもので覆わないでください。

【成分・分量】 (100mL中)

成 分	分 量	はたらき
ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル (アンテドラッグステロイド剤 PVA)	0.15 g	湿疹、皮膚炎等の炎症を鎮めます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0 g	抗ヒスタミン作用により、かゆみの発生を抑えます。
クロタミトン	5.0 g	かゆみを鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.3 g	炎症を鎮めます。
l-メントール	3.5 g	清涼感を与え、かゆみを鎮めます。
dl-カンフル	1.0 g	
リドカイン	2.0 g	局所麻酔作用により、かゆみをすばやく鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g	殺菌作用があります。
パンテノール	1.0 g	はれ、赤みをおびた肌の修復を促進させます。
サリチル酸グリコール	1.0 g	皮膚の炎症を鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	0.1 g	血行を良くして皮膚の新陳代謝を高め修復を助けます。

添加物：プロピレングリコール、BHT、ジプロピレングリコール、エタノール、ハアセチルシロ糖、pH調節剤

〈成分に関連する注意〉

本剤はアルコールを含んでいるので、塗布時にしみる場合があります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください。(容器を横向きなどで保管すると振動などにより薬液が出過ぎたり、液漏れの原因となる場合があります)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるのを防ぐため)
- (4) 火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。
- (5) 液剤が患部で垂れないように注意して使用してください。
- (6) 液もれを防ぐために、使用後はキャップをしっかりと締めてください。
- (7) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (8) メガネ、時計、アクセサリなどの金属類、衣類、プラスチック類、皮革製品、床や家具などの塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- (9) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

グロー薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話 06-6351-5331 (代表) 受付時間 9:00~17:00 (土日祝日を除く)

発売元



グロー薬品工業株式会社

大阪府中央区内淡路町1丁目3番2号

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五柱1169-142