

このケースの記載は使用前に必ずお読みください。  
また、必要なとき読めるように保存しておいてください。

## シオノギ軟膏SP 第2類医薬品

### ⚠ 使用上の注意……

してはいけないこと 

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむしなど または化膿している患部  
(2)すり傷、切り傷 (3)目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分など

2. 次の場合には使用しないでください

- (1)美容目的の使用 (2)かぶれ防止のための化粧下、ひげそりあと  
(3)にきび (4)赤ら顔(赤鼻) (5)おむつかぶれ(しっしん以外の原因によることが多い)

3. 顔面には広範囲に使用しないでください

4. 長期運用しないでください

よくなれば中止してください。だらだらと無用に長く使わないでください。

相談すること 

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

- (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦または妊娠していると思われる人 (3)薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人 (4)患部が広範囲の人 (5)湿潤やただれのひどい人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむしなどの白せん、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

……効能・効果……

しっしん、かゆみ、皮膚炎、虫さされ、かぶれ、あせも、じんましん

……用法・用量……

1日数回 適量を患部に塗擦してください。

<用法・用量に関する注意>

(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用し、内服しないでください。(5)ごしごしすりこまないで、のばすようにうすくぬってください。(あつめにぬっても効きめが高まるわけではありません)(6)始めは1日に2～3回ぬり、よくなるにつれて回数をへらしてください。(7)塗擦後、その部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないでください。

……成分・分量……

シオノギ軟膏SPは、白色～淡黄色の軟膏で、1g中に次の成分を含有しています。

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	1.5mg
グリチルレチン酸	5mg
ジフェンヒドラミン塩酸塩	20mg
クロタミトン	50mg
リドカイン	20mg
トコフェロール酢酸エステル	10mg
アラントイン	2mg
イソプロピルメチルフェノール	1mg

添加物として マクロゴール、クエン酸水和物を含有しています。

……保管および取扱い上の注意……

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変化します)(4)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

お問い合わせ  
窓口

大阪 06-6209-6948  
東京 03-3406-8450  
受付時間9時～17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

電話 0120-149-931

®:登録商標 A1



販売元  
シオノギヘルスケア株式会社  
大阪市中央区北浜2丁目6番18号

製造販売元  
万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142