



販売販売先 万創製薬株式会社 142
 三浦県多摩郡五野町169-142
 万創製薬株式会社「お薬相談窓口」
 電話 0598-30-5376
 受付時間 10:00~17:00(休・日、夜間・休日を除く)

(1) 本品は20℃以下の室温で、目立たぬ場所に保存してください。(2) 高温多湿を避け、直射日光を避けてください。(3) 小児の手の届かない所に保管してください。(4) 虫さされやかゆみ等の症状がひどい場合は、医師の診察を受けてください。(5) 使用期限を過ぎた薬は使用しないでください。(6) 開封後は使用期限経過後でも、なるべく速やかに使用してください。

保管方法及び取扱上の注意

ケリーの色白 内容量 6g

ロケ開

かゆみ
虫さされ

無香料 無着色
かゆみを抑える
炎症をしずめる
皮膚の組織修復



第2類医薬品 小どもにも使える!

1日数回、適量を患部に塗擦 ケリーの色：白色



イソプロパ
Haplycom
新 経路対策
第2類
医薬品

B2301

かゆみ 虫さされ
皮膚炎
湿疹

6g

かゆみ 虫さされ
皮膚炎
湿疹

イソプロパ
Haplycom
新 経路対策
8つの
有効成分配合

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬 Anti-itching Agent 第2類 医薬品
 エクシロンプロクウム

△ 使用上の注意

してはいけないこと
 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
 1. 次の部位には使用しないでください。(1) 水痘 (水ぼうそう)、みずむし、たむし等又は化膿している患部 (2) 目の周囲、粘膜等 (3) 顔面には、広範囲に使用しないでください。3. 長期連用しないでください。

△ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が広範囲の人 (5) 選薬やただれのひどい人 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺痒感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし、たむし等の白癩、にきび、化膿症状、特務的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果：かゆみ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、かぶれ、あせも、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

用法・用量に関連する注意

(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 小児に使用する場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないよう、注意ください。目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。

成分・分量 (1g中)

ブドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	1.5mg
グリチルチン酸	5mg
ジフェニヒドラン塩酸塩	20mg
クロタマトン	50mg
リドカイン	20mg
トコフェロール酢酸エステル	10mg
アラントイン	2mg
イソプロピルメチルフェニール	1mg

添加物として、セトステアリルアルコール、中鎖脂肪酸グリセリド、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、モスチラン酸ゲリゼリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルアルコール、エチル酸Na、パラベン、リノ酸、水酸化ナトリウム、ジブチルヒドロキシトルエンを含有します。

上段4割製薬記号1割は使用期限



MADE IN JAPAN
 4 535653 001129



12月27日
 開封時に記入してください
 年月日
 開封時

開け口

ニックス
 パッケージ
 FSC® C008430



製作用紙産品資源削減率 80% (2020/14/19) 31