

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬 Anti-itching Agent

第2類
医薬品

エクシロンプロ軟膏

△ 使用上の注意

X してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1.次の部位には使用しないでください。(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部(2)目の周囲、粘膜等 2.顔面には、広範囲に使用しないでください。
3.長期連用しないでください。

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人 (2)妊娠又は妊娠していると思われる人 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4)患部が広範囲の人 (5)湿潤やただれのひどい人 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癖、にさび、化膿症状、持続的な刺激感

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

(1)本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。(2)高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所で密栓して保管してください。(3)小児の手の届かない所に保管してください。(4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因にならないよう品質が変わります)(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00(ただし、土、日、祝日は除きます)

効能・効果：かゆみ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、かぶれ、あせも、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

用法・用量に関する注意

(1)定められた用法・用量を守ってください。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。

成分・分量 (1g中)

ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	1.5mg
グリチルレチン酸	5mg
ジフェンヒドラミン塩酸塩	20mg
クロタミン	50mg
リドカイン	20mg
トコフェロール酢酸エステル	10mg
アラントイン	2mg
イソプロピルメチルフェノール	1mg

添加物として、マクロゴール、クエン酸水和物を含有します。



4 535653 001150

MADE IN JAPAN