

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名

ヒフルEXクリーム

第②類医薬品

〈鎮痒消炎薬〉

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
(2)目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください 3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)患部が広範囲の人。(5)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 かゆみ、かぶれ、湿疹、皮膚炎、あせも、じんましん、虫さされ
用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

[用法・用量に関連する注意](1)小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。(3)外用にのみ使用してください。

成分・分量 (100g中) プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g、ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g、*l*-メントール 3.5g、*d,l*-カンフル 1.0g、イソプロピルメチルフェノール 0.1g、クロタミトン 5.0g 添加物として、パルミチン酸イソプロピル、ワセリン、ベヘニルアルコール、ステアリルアルコール、セタノール、モノステアリン酸グリセリン、セトマクロゴール、ジイソプロパノールアミン、ジメチルポリシロキサン、パラベン、ジブチルヒドロキシトルエンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります。)(4)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。(5)メガネ、時計、アクセサリー、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。(6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂 1169-142

お客様
相談室

電話 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

OPEN ▶