

開け口

【特徴】

- ①鎮痛消炎成分フェルピナクが炎症を起こした筋肉や関節に効果を発揮
- ②l-メントール6%配合で、爽快な使用感

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 長期連用しないでください。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名前	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

成分・分量

(100mL中)

成分	分量
フェルピナク	3.0g
l-メントール	6.0g
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.1g

添加物として、ヒプロメロース、ジブチルヒドロキシトルエン、ジイソプロパノールアミン、グリチルルチン酸、マクロゴール400、クエン酸水和物、エタノールを含有します。

効能・効果

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛(五十肩など)、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲(うちみ)、捻挫

用法・用量

1日2～4回、適量を患部に塗布してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 15歳未満の小児に使用させないでください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 薬剤塗布後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

万協製薬株式会社 「お客様相談室」

電話 0598-30-5376
受付時間10:00～17:00
(ただし土、日、祝日は除きます。)

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

セルフメディケーション

税 控除 対象

肩こり・関節の痛みに

アンマクール

ゴールドEX

フェルピナク **3.0%** 配合

鎮痛消炎成分
が効く! **100mL**



第2類医薬品

Topical Anti-Inflammatory Analgesic Lotion

省資源化のため箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の説明を必ずお読みください。また、必要に応じて読めるよう大切に保管してください。

外用鎮痛消炎薬

販売名 アンマクールゴールドEX

第2類医薬品

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。
- (5) 揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかりと締めてください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、繊維の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

火気厳禁

第二石油類、水溶性、危険等級III
(エタノール、マクロゴール)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

NEO TRADITIONAL JAPANESE MEDICINE



4 535653 001686