

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。(5)イヤホン、補聴器、メガネ、アクセサリ類、時計、寝具、家具、床、化学繊維、プラスチック類、皮製品などに付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。(6)染めた髪につくと色落ちすることがあります。

開封口▼

綿棒につけて
患部に塗布

30mL

※本品に綿棒は付属されていません

ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

× してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
 - (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部。
 - (2)目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4)患部が広範囲の人。
 - (5)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

第②類医薬品 〈鎮痒消炎薬〉 ヒフールER液プラス 30mL

【効能・効果】湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん


【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布してください。

耳に使用する場合の容器のご使用方法

- 本品は点耳薬ではありません。耳の中に直接滴下しないでください。
- ※本品に綿棒は付属されていません。



1. 平らな所にティッシュ等を敷いた上でご使用ください。(薬液が過剰に出てこぼれる場合があります)
2. 容器の先端を綿棒に垂直に軽く当ててください。そのまま先端が引込むように数秒押し付けると、少しずつ薬液が出てきます。これを数回繰り返す。綿棒全体にしみこませてください。
容器の本体部分を強く押さないでください。薬液が過剰に出る場合があります。
3. 薬液がついた綿棒で患部に塗布してください。



※塗布する際は、耳の奥や鼓膜を傷つける恐れがありますので、耳の奥まで綿棒を入れないでください。綿棒の先から約1.5cmの部分(綿棒の下)を持って、擦らずにやさしく塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児(15才未満)に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。(4)外用にのみご使用ください。

【耳に使用する場合の注意】(1)本剤は点耳薬ではありませんので、耳の中に直接滴下しないでください。(2)薬液が耳の奥にたれないように、【耳に使用する場合の容器のご使用方法】を必ず守ってください。(3)長期連用しないでください。(目安として2週間以内)(4)鼓膜に穴が開いていることが疑われる場合、または耳だれが出ている場合は、使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。(5)使用後、耳が聞こえにくくなった場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。(6)本剤の使用開始目安年齢は10才以上です。なお、小児(15才未満)だけでの使用はおやめください。(7)本剤塗布直後はイヤホンや補聴器を使用せず、十分に乾いたことを確認してから使用してください。(目安として1時間後)

【成分・分量】(100mL中)プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル0.15g、ジフェンヒドラミン塩酸塩2.0g、クロタミトン3.0g、グリチルリチン酸二カルシウム1.0g、アラントイン0.2g、イソプロピルメチルフェニール0.5g、リドカイン2.0g、l-メントール3.5g
添加物として、エドト酸ナトリウム水和物、ジブチルヒドロキシトルエン、乳酸、塩酸、プロピレングリコール、グリセリンを含有します。

PVA配合

耳などの かゆみに

8つの有効成分配合

液

ヒフールER液プラス
(100mL中)プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA) 0.15g配合

セルフメディケーション
税 控除 対象

第②類医薬品

紙箱