

省資源化のため箱が説明書を兼ねています。

ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 第②類医薬品

販売名: ギルメサゾンEX  
(鎮痒消炎薬)

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。(2)目の周囲、粘膜等。2. 顔面には、広範囲に使用しないでください 3. 長期連用しないでください

#### 👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください (1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)患部が広範囲の人。(5)湿潤やただれのひどい人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

#### 🔑 効能・効果

かゆみ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、かぶれ、あせも、じんましん

🔑 用法・用量 1日数回、適量を患部に塗擦してください。

#### ⚠ (用法・用量に関連する注意)

(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。

#### 🔑 成分・分量 (1g中)

プレドニゾン古草酸エステル酢酸エステル(PVA) 1.5mg、グリチルレチン酸 5mg、ジフェンヒドラミン塩酸塩 20mg、クロタミトン 50mg、リドカイン 20mg、トコフェロール酢酸エステル 10mg、アラントイン 2mg、イソプロピルメチルフェノール 1mg、添加物として、マコゴール、クエン酸水和物を含有します。

#### 🔑 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。  
(2)小児の手のとどかない所に保管してください。  
(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります。)  
(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元

三宝製薬株式会社

東京都新宿区下落合2-3-18

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五柱1169-142

お問い合わせ先

(お客様相談室) 電話 03-3952-0100  
月～金曜日9:00～17:00(祝日を除く)

副用被救済制度 ☎ 0120-149-931