

「特徴」

1. 8つの有効成分が、つらい頭皮の痒み、湿疹に効きます
2. プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(アンデラッグステロイド)配合
3. l-メントール配合でスーッと爽やかな使い心地です
4. 患部に直接塗布しやすいピンポイント容器です

三井薬品株式会社
お客様相談窓口
電話：03-5809-2790
受付時間：9:00～17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931



目には入れないでください

火気厳禁
第二石油類、危険等級III
(エタノール)

販売元 三井薬品株式会社
東京都千代田区若本町2-10-2 神田カサミビル南

製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142



頭皮湿疹・痒みに

ヒフール
EX液α

30mL

第②類
医薬品

爽快な清涼感

虫さされ、じんましん、あせも
患部に直接塗れる
皮膚炎・痒み・かぶれ

殺菌
成分配合
(イソプロピルメチルフェノール)



炎症を鎮め
痒みを抑える

頭皮
の痒み
湿疹

治療薬

目には入れないこと

ヒフールEX液α

第②類医薬品 30mL

ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

〈鎮痛消炎薬〉ヒフールEX液α

【効能・効果】かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも、虫さされ
【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)本剤は外用にのみ使用し内服しないでください。(5)患部が傷になっている場合は、塗布したときにしみる場合があります。

〈容器の使用方法〉(1)使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で中栓の先を2～3回空押しして中の空気を抜いてください。(暑い時期、高温の場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合等に、容器内の圧力が高まり薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです)(2)使用するときは容器を下向き又は斜めにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。容器の先端を患部から離すと液が出なくなります。(強く押し当てたり、容器胸部を強く握ると薬液が多く出ます)

【成分・分量】(100mL中) プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(アンデラッグステロイド) 0.15g、ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g、クロタミン 3.0g、グリチルリチン酸二カリウム 0.2g、l-メントール 3.5g、リドカイン 1.0g、イソプロピルメチルフェノール 0.1g、アラントイン 0.2g
添加物として、1,3-ブチレングリコール、ジブチルヒドロキシトルエン、エタノール、pH調節剤、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロースを含有します。

〈保管及び取扱い上の注意〉(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。(5)メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、プラスチック類、化繊の衣類、皮革製品、床や家具等の塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。(6)染めた髪につくと色落ちすることがあります。(7)使用後はキャップをしっかりと締めてください。(8)使用期限(箱底面に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります

1. 次の部位には使用しないでください
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。(2)創傷面、目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬等によりアレルギー症状(発疹・発赤、かぶれ等)を起こしたことがある人。
(4)患部が広範囲の人。(5)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください