

開封口

產品名稱：Hifuru ZX Gel

第2類醫藥品 経皮吸収鎮痛消炎剤

特徴

- Hifuru ZX Gelは含有Diclofenac Sodiumの非類固醇鎮痛消炎凝膠。
- Diclofenac Sodium抑制引起疼痛的Prostaglandin産成、並且對關節、肌肉、腰、肩膀酸痛非常有效。
- 本品含有I-Menthol、塗擦後舒適清涼。

成分・分量(100g中)

成分	分量	効果
Diclofenac Sodium	1.0g	抑制引起疼痛的Prostaglandin産成、緩解疼痛
I-Menthol	3.0g	清涼感、緩解疼痛

添加物：Macrogol 400, Ethanol, Sodium Pyrosulfite, Hypromellose, Hydroxyethylcellulose, Lactic Acid, Hydrophobically Modified Hydroxypropylmethylcellulose

適應症

腰痛、肩頸僵硬造成的肩膀酸痛、關節痛、肌肉痛、腱鞘炎(手・手腕的疼痛)、手肘疼痛(網球肘等)、挫傷、扭傷

用法・用量

塗適量於患處，1日3~4次。
塗抹本產品後，請勿以保鮮膜等透氣差的物品包覆患部。請勿同時並用含有本成分的其他外用藥。

REG No.: 22700APX00505000
Manufactured by:
Bankyo Pharmaceutical Co., Ltd.
1169-142, Gokatsura, Taki-cho,
Taki-gun, Mie, Japan

Made in JAPAN



50g



成分・分量 (100g中)

成分	分量	はたらき
ジクロフェナクナトリウム	1.0g	痛みのもととなるプロスタグランジンの生成を抑えて、痛みをやわらげます。
l-メントール	3.0g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。

添加物として、マクロゴール、エタノール、ピロ亜硫酸ナトリウム、ヒプロメロース、ヒドロキシエチルセルロース、乳酸、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロースを含有します。

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

- 1日3~4回適量を患部に塗擦してください。ただし、塗擦部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。
(用法・用量に関連する注意)
- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は、痛みやはれなどの原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3)本剤は外用のみ使用し、内服しないでください。
- (4)1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (5)目にいらないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。
- (6)使用部位に他の外用剤を併用しないでください。
- (7)通気性の悪いもの(ラップフィルム、矯正ベルト等)で使用部位を覆い、密封状態にしないでください。
- (8)使用後は手を洗ってください。

肩・腰・関節の

痛み

効きめの成分が

直接浸透

ジクロフェナク
ナトリウム 配合

+ l-メントール



ヒパールズジェル

ジェル

チューブタイプ

第2類医薬品 50g



[Precautions]

(If you do not follow these instructions, the current symptoms may worsen or adverse reactions are more likely to occur.)

1. This product should not be taken in the following persons.
 - (1) Patients who have had an allergic symptom to this drug or its ingredients.
 - (2) Patients who have experienced asthma.
 - (3) Pregnant women or women suspected of being pregnant.
 - (4) Children under 15 years old.
2. The medicine should not be used on the following parts:
 - (1) Periorbital area, mucosa, etc.
 - (2) Weak skin (face, head, underarm, etc.)
 - (3) Eczema, rash, injury
 - (4) Athlete's foot/tinea or purulent lesions
3. Do not take this medicine for a long time.

[Precautions for storage and handling]

1. Store in a cool, low humidity place away from direct sunlight, and seal tightly.
2. Keep away from fire, and do not throw into fire after use.
3. Keep out of reach of children.
4. Be careful not to get it on as it may soften synthetic resin, melt paint, or discolor metal.
5. Do not transfer the medicine to a different container. (It may lead to misuse or alter the quality of the drug.)
6. Do not use the product after the expired date. Also, use as soon as possible after opening the package even if the expiration date has not passed.