

省資源化のため箱が説明書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の説明をよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

ラバルンUFクリーム

第2類
医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)湿潤やただれのひどい人。
 - 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症状 |
|------|--------------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、熱感、乾燥感 |
- 1～2週間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

皮膚炎、湿疹、おむつかぶれ、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

用法・用量に関連する注意

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。
- (4)患部を清潔にした後、塗布してください。

成分・分量 (100g中)

ウフェナマート	5.0g
ジフェンヒドラミン	1.0g
グリチルレチン酸	0.3g
トコフェロール酢酸エステル	0.5g
ベンゼトニウム塩化物	0.1g
添加物:ワセリン、ステアリルアルコール、セタノール、モノステアリン酸グリセリン、パルミチン酸イソプロピル、ペヘニルアルコール、セトマクログール1000、ジメチルポリシロキサン、パラベン、ジブチルヒドロキシトルエン	

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

製造販売元 **万協製薬株式会社**
三重県多気郡多気町五柱1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376 受付時間 10:00～17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)