

開封口

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- 1. 次の人は使用しないでください。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしていることがある人
  - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してもぜんそくを起したことがある人。
  - (3) 15歳未満の小児。
- 2. 次の部位には使用しないでください。
  - (1) 目の周囲、粘膜等。
  - (2) 皮膚の弱い部位(顔、わきの下)等。
  - (3) 湿疹、かぶれ、傷口。
  - (4) みずびしたたりなど又は化膿している患部。
- 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。
- 4. 連続して2週間以上使用しないでください。
 

(本剤を痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診察を受けてください。)

△ 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の診察を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (4) 高齢者。
  - (5) 次の診断を受けた人。気管支ぜんそく
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

- 1. 症状の名称 症状
  - ショック(アナフィラキシー) 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、呼吸が苦しい、くも膜下出血、意識障害、血圧の急激な低下等があらわれる。
- 3. 使用後、次の症状が現れることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この箱を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 

下痢・軟便
- 4. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品 (鎮痛消炎薬) 販売名)ロキトラッドL2

【効能・効果】 関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)

【用法・用量】 1日3～4回、適量を患部に塗布してください。

- 【用法・用量に関する注意】
  - (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
  - (2) キャップを取り外し、スポンジ部分を肌に数回軽く押しあて、スポンジに薬液をしみ込ませてから使用してください。スポンジ面に薬液が十分しみ込んでいない状態で使用すると、スポンジが破損する場合があります。○同じ部位に他の軟膏、クリーム剤を併用するとスポンジを痛めることがあります。(3) 使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。(4) 1回あたり約2g(塗布面積：手のひら約10枚分)、1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
  - (5) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている痛気治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤剤のみで、症状がある場合だけ使用してください。(6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は、眼科医の診察を受けてください。
  - (7) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】(100g中) ロキソプロフェンナトリウム水和物…1.13g(無水物として1g)、L-メントール…3.0g 添加物：マクロゴール400、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、乳酸、エタノール

使用期限 製造番号



つらい 痛み に効く ローション 50g

肩こり・腰痛・首すじなど

ロキソプロフェン

ロキソプロフェンナトリウム水和物

PHARMACARE ローション 50g

肩の痛み・腰痛

ロキソプロフェン

ロキソプロフェンナトリウム水和物

つらい 痛みの元へ 直接浸透

Q-メントール配合

W効果

肩・首すじ・腰



クールタイプ

ロキトラッドL2

第2類医薬品

開封年月日 年 月 日 開封時に記入してください

- 【保管及び取扱い上の注意】
  - (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
  - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
  - (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
  - (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
  - (5) 火気に近づけないでください。
  - (6) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化粧の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面に付着すると、変質又は変色することがありますので、付着しないように注意してください。

〈お問い合わせ先〉 本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせください。 帝國製薬株式会社 お客様相談室 電話 (0879)25-2363 受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

発売元 ティコクファルマケア株式会社 香川県東かがわ市三本松567番地 製造販売元 万協製薬株式会社 三重県多気郡多気町五桂1169-142 副用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

セルフメディケーション 税 控除対象 火気厳禁 第二石油類 危険等級III (エタノール)

MADE IN JAPAN [内容量]50g



A 24 02

