べたつかないクリーム

ぶり返してつらい

首元、お腹周り、ひじ・ひざの内側、下着かぶれに

汗などによるかゆみ・かぶれに

お肌のための汗かぶれ治療薬

MEDIVEIL+

Designed to Protect Bare Skin

20g

PRICKLY HEAT CREAM

02

使用期限

製造番号

FACE to EARTH Protection
ノンVOCインキを使用

A2603

鎮痒消炎薬　第(2)類医薬品

MV　デオEXクリーム

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください(1)水痘(水ぼうそう)、かぶれ・ただれ等又は腫している患部。(2)目の周囲、粘膜等。2. 顔面には、広範囲に使用しないでください 3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)患部広範囲の人。(5)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚（患部）が変色し、化膿症状、持続的な刺激感	

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、ひふましん

用法・用量

[用法・用量に関連する注意] (1)定められた用法・用量を守ってください(2)小児に使用する場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください(3)目にはいらないように注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。

成分・分量（100g中）

ブルボニンロンラ薬理エステル(PVA)…0.15g	添加物として、パルミチン酸イソプロピル、白色ワセリン、ベヘニルアルコール、ステアリルアルコール、セタノール、セタマクロゴール1000、ジイソプロパノールアミン、ジメチルポリシロキサン、パラベン、プロピレングリコール、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンヒドロキシルエタン含有します。
·メントール……3.5g	
白色ワセリン……1.0g	
·カンフル……1.0g	
·ヒドロコルチゾン酪酸エステル……0.1g	
·ジフェンヒドラミン塩酸塩……5.0g	

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になり、品質が変わります。)。(4)本剤のついた手や、目やお口に触れないようにしてください。(5)メガネ、時計、プラセチックプ、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装部等に付着することがあります。付着したときは、直ちに水で洗い流してください。(6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

OPEN

万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話　0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931
製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。

セルフメディケーション 税控除対象

紙：箱

4 535653 003703

チューブの開け方

キャップを裏返して差しこむ

薬剤過敏のかたは、裏面文書をよくお読みください。ご使用に際して、この箱の記載内容をよくご確認ください。また、必要な時に読めるように保管してください。

Antipruritic & Anti-inflammatory Agent

Cream containing a steroid, effective against itching, eczema, and rash caused by perspiration, etc.