

↑ OPEN

省資源化のため
箱が添付文書を
兼ねています。

matsu
kiyo

MEDIVEIL+
Designed to Protect Bare Skin

火気厳禁
第二石油類 危険物等級Ⅲ
(エタノール)

万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五柱1169-142
※この商品は(株)マツキヨココカラ&
カンパニーのオリジナル商品です。



セルクメデケーション
税 控 除 対象



25g

ANCH-ITCH
GEL
LOTION

04

A2603

FACE to
EARTH

Protection
ノンVOCインキを使用

使用
期限
製造
地

ご使用に際して、この箱の記載内容をよくお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬 第②類医薬品

MV かゆみ止めジェルローション

Antipruritic & Anti-Inflammatory Agent
Rapidly alleviates itchiness and suppresses inflammation
(swelling and redness) that causes insect bite marks.

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 水疱(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2) 創傷面、目や目の周囲、粘膜等。
- 2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
- 3. 長期連用しないでください

△ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|--------|-------------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| 皮膚(患部) | みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感 |

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かゆみ、湿疹、皮膚炎、かびれ、じんましん、あせも、虫さされ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。〔用法・用量に関連する注意〕(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。(5)塗布後、患部をラップフィルム、絆創膏等の通気性の悪いもので覆わないでください。

成分・分量(100g中)

| | |
|--|-------|
| プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(アンテドラッグステロイド剤 PVA) | 0.15g |
| ジフェニヒドラミン塩酸塩 | 1.0g |
| グリチルリチン酸二カリウム | 0.3g |
| バンテロール | 1.0g |
| アラントイン | 0.2g |
| トメントール | 2.5g |
| dl-カンフル | 0.5g |

添加物:プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(4)セチルエーテル、ヒプロメロース、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ジブチルヒドロキシトリエタノール、乳酸、L-乳酸ナトリウム液、エタノール

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)火気に近づけないでください。(5)メガネ、時計、アクセサリー、プラスチック類、化粧品、皮革製品、床や家具などの塗装面に付着すると変質することがあるので、注意してください。(6)染めた髪に付くと色落ちすることがあります。(7)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封したあとはなるべく早く使用してください。

皮ふ炎
虫さされによる
黒く残る*
かきこわしに

お肌の
ための
かゆみ・虫さされ治療薬



修復成分W配合



ピンポイント
容器

塗り広げやすいジェルローション

※かゆみを伴うかきあとなどに