

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

かゆみ・虫さされに

ヒフールプレミアム液

第②類医薬品

本剤を長期間使用すると、皮膚の血管が拡張して赤みが発生したり、皮膚が薄くなったりすることがあります。顔面では皮膚の赤みが発生しやすいことから、特に注意してください。本剤を化粧下、ひげそり後に使用しないでください。また、症状が改善した後は漫然と連用しないでください。

- ヒフールプレミアム液は、アンテドラッグステロイドを配合したお薬で、虫さされのしつこいかゆみや湿疹、かぶれなどに効きます。
- アンテドラッグステロイドとは
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルは、患部で優れた抗炎症作用を発揮し、その後、体内に吸収されると作用の弱い物質に分解される特性があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の部位には使用しないでください。
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
(2) 創傷面。
(3) 目や目の周囲、粘膜等。
- 顔面には、広範囲に使用しないでください。
- 長期連用しないでください。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、かぶれ、虫さされ、かゆみ、あせも、じんましん

裏面もお読みください。

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) キャップをとりはずし、スポンジ部分を肌に数回軽く押し当てて、スポンジに薬液をしみ込ませてから使用してください。スポンジ面に薬液が十分しみ込んでいない状態で使用すると、スポンジが破損する場合があります。
○同じ部位に他の軟膏・クリーム剤を併用するとスポンジを傷めることがあります。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 塗布後、患部をラップフィルム、絆創膏等の通気性の悪いもので覆わないでください。

【成分・分量】 (100g中)

成分	分量	はたらき
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル (アンテドラッグステロイド剤 PVA)	0.3g	湿疹、皮膚炎等の炎症を鎮めます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみの発生を抑えます。
サリチル酸グリコール	1.0g	皮膚の炎症を鎮めます。
トメントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみを鎮めます。
dl-カンフル	1.0g	

添加物：1, 3-ブチレングリコール、ラウロマクロゴール、ジブチルヒドロキシトルエン、エタノール

＜成分に関連する注意＞

本剤はアルコールを含んでいるので、塗布時にしみる場合があります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください。(容器を横向きなどで保管すると振動などにより薬液が出過ぎたり、液漏れの原因となる場合があります)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。
- (5) 揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかりと閉めてください。
- (6) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- (7) メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、衣類、プラスチック類、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

- ハチなどに刺された際に、広範囲のむくみやはれ、息苦しさ、吐き気、下痢、発熱などの症状が見られるときは、直ちに医師の診療を受けてください。
- 症状がひどい場合や患部が広範囲なときは、本剤では対処できないことがあります。その場合は医師の診療を受けてください。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00～17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)

製造 万協製薬株式会社
販売元 三重県多気郡多気町五桂1169-142