

開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 長期連用しないでください。

🗨 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、痛み、熱感、ヒリヒリ感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名前	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

内容量 100mL MADE IN JAPAN

火気厳禁

【成分・分量】100mL中
 フェルピナク 3.0g
 l-メントール 6.0g
 クロルフェニラミン塩酸塩 0.1g
 ノナン酸パニリルアミド 12.0mg
 添加物として、マクロゴール400、
 エタノール、ジブチルヒドロキシトルエン、グリチルレチン酸、ジソプロパノールアミン、クエン酸水和物を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓し、立てて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。
- (5) 揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかりと締めてください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、繊維の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

副作用被害救済制度
☎ 0120(149)931

万協製薬株式会社「お客様相談室」
 電話番号 0598-30-5376
 受付時間 10:00～17:00
 (ただし、土、日、祝日は除きます)

製造販売元
 万協製薬株式会社
 三重県多気郡多気町五桂 1169-142

つらい 肩の痛み、腰痛、 関節痛に


TOPICAL ANTI-INFLAMMATORY ANALGESIC

セルフメディケーション

税 控除 対象

A&

血行促進
成分配合
さらりとした
液体タイプ



つらい 肩の痛み、 腰痛、 関節痛に

TOPICAL ANTI-INFLAMMATORY
ANALGESIC

鎮痛成分
フェルピナク配合

冷感成分
l-メントール配合

血行促進成分
ノナン酸パニリルアミド配合

首曲がり容器

第2類医薬品

外用鎮痛消炎薬
オノフェFE液α

100mL

開封年月日

年 月 日

開封時に記入してください

第2類医薬品

外用鎮痛消炎薬
オノフェFE液α

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日2～4回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (5) 皮膚の特に弱い方は、同じ所に続けて使用しないでください。
- (6) スポーツや入浴等、汗のかく前・後に使用した場合、ヒリヒリとした刺激、痛みや熱感が増すことがあります。これらの症状が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します。

紙 箱

A2607



使用期限

製造番号

1

900W