

開封口

△ 使用上の注意

☒【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人には使用しないでください
 - (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 目の周囲、粘膜など。
 - (2) 皮膚の弱い部位(顔、わきの下など)。
 - (3) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (4) みずむし、たむし等または化膿している箇所。
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。
4. 連続して2週間以上使用しないでください
(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛みなどの症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください。)

■【相談すること】

1. 次の人には使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 次の診断を受けた人、気管支ぜんそく。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記のような重篤な症状が起こることがあります。その場合には直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
4. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(他の疾患の可能性があります)

ご使用に際しては、この箱の説明文を必ずお読みください。必要なときに読めるように、大切に保管してください。

第2類医薬品 ロキソールL2 (鎮痛消炎薬)

【成分・分量】 本品100g中

ロキソプロフェンナトリウム水和物・・・1.13g(無水物として1g)
 L-メントール・・・3.0g
 添加物：マクロゴール400、疎水化ビドロキソプロピルメチルセルロース、乳糖、エタノール

【効能・効果】

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)

【用法・用量】

1日3～4回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) キップを取り外し、スポンジ部分を前に数回軽く押しあて、スポンジに薬液をしみ込ませてから使用してください。スポンジ面に薬液が十分にしみ込んでいない状態で使用すると、スポンジが破損する場合があります。○同じ部位に他の軟膏、クリーム剤を併用するとスポンジを痛めることがあります。
- (3) 使用部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないでください。
- (4) 1回あたり約2g(塗布面積：手のひら約10枚分)、1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (5) 本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (7) 外用にのみ使用してください。

使用期限
製造番号

120701
BAKA601



クールタイプ

50g

つらい
痛みに直接浸透

肩・首筋・腰

ロキソプロフェン
(ロキソプロフェンナトリウム水和物)

ロキソプロフェン
(ロキソプロフェンナトリウム水和物)

クールタイプ

つらい
痛みに
直接浸透

肩・首筋・腰



ロキソールL2

ローション

第2類医薬品

常盤薬品
NOEVIR GROUP

50g

開封年月日

年 月 日

開封時に記入してください

【保管および取扱いの注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリなどの金属類、繊維の衣服、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質または変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。

発売元

常盤薬品工業株式会社
神戸市中央区港島中町6-13-1
NOEVIR GROUP

お問い合わせは

常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室 0120-875-710まで

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

副作用被害救済制度
0120-149-931

火気厳禁
第二石油類
危険等級Ⅲ(エタノール)

50g 1,600円(税別)



4 987156 1305080

A2607

1

LOWE