

100mL

微香性

今まで人前でニオイが気になってた人や、ニオイに敏感な人でも安心して使用できます。

塗りやすい
横型ボトル

首の部分が曲がって、
スポンジがピッタリと接し
ますので、背中や腰などの
塗りにくい患部にもスム
ーズにむらなく適量を塗布
できます。

つらい肩こり
腰痛に

サリチル酸グリコール、ノ
ナン酸パニリルアミドおよ
びノメントール等の配合
により、つらい肩こり、腰
痛、筋肉痛の原因となる炎
症や痛みをやわらげます。

ノメントール配合

第3類医薬品 微香性

外用鎮痛消炎剤

ストマッシュW

ローション

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに開めるよう大切に保管してください。

火気厳禁 第二石油類 水溶性 100mL
危険等級Ⅲ (エタノール)

肩こり 腰痛・ 筋肉痛に

成分・分量 (100g中)

- サリチル酸グリコール.....3.0g
 - ノメントール.....3.0g
 - クロルフェニラミンマレイン酸塩.....0.1g
 - グリチルリチン酸.....0.05g
 - ノナン酸パニリルアミド.....0.015g
 - ニコチン酸ベンジルエステル.....0.02g
- 添加物：ヒプロマロース、プロレングリコール、
アジピン酸ジイソプロピル、エタノール

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

《用法・用量に関連する注意》

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らぬよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- 外用にのみ使用してください。
- 入浴前後の使用はさけてください。
- 入浴後等肌をこすったり、汗をかいたときは、本剤による刺激を強く感じる場合があります。激しい痛み又は刺激感やかゆみを感じた場合には使用を中止し、こすらないでやさしくなでるように患部をよく泡だてた石けんなどで数回洗った後、患部を冷水や軽くしぼったぬれタオルなどで十分に冷やしてください。症状の改善がみられない場合は、この箱を持って医師に相談してください。
- 塗布した患部をコタツや電気毛布で温めないでください。
- 皮膚の弱い人は、同じところに続けて塗布しないでください。
- 本剤を塗った後の患部を通気性の悪いものでおおわないでください。
- スポンジ面をゆっくりに数回押し当て、スポンジに薬液を十分しみ込ませてから患部に塗布してください。薬液をスポンジ面にしみ込ませないで使用する、スポンジが破損する場合があります。



スポンジ面をゆっくりに数回押し当て、スポンジに薬液を十分しみ込ませてから患部に塗布してください。



4 956622 106865

Wの
効能

鎮痛消炎成分
サリチル酸グリコール
血行促進成分
ニコチン酸ベンジルエステル

ノメントール配合

第3類医薬品 微香性

外用鎮痛消炎剤

ストマッシュW

ローション

セルフメディケーション
税控除対象

腰痛・ 筋肉痛に 肩こり



100mL

効能・効果

肩こり、腰痛、関節痛、筋肉疲労、筋肉痛、打撲、むねざ

保管及び取扱い上の注意

- 使用後は、必ずキャップを十分に締めて、直射日光の当たらない涼しい所に立てて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わってしまうことがあります。)
- 火気に近づけないでください。
- 時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のある床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

▲ 使用上の注意

※ 決してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口

■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などにアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ、はれ、痛み

- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

製造販売元
ジャパンメテック株式会社
富山県富山市横越 168

お客様相談窓口 ☎076-438-1107
受付時間：9:00～17:00
月～金(祝日・年末年始を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)