

みんなの声で、よくなるね。

## インドメタシンローション1.0%

用法・用量 1日4回を限度に適量を  
患部に塗布

対象年齢 11歳以上

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

## △ 使用上の注意

- △ してはいけないこと  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください。  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(2)せんそくを起こしたことがある人
  2. 次の部位には使用しないでください。  
(1)目の周囲、粘膜等  
(2)湿疹、かぶれ、傷口  
(3)みずむし、たむし等又は化膿している患部
  3. 長期連用しないでください。

## △ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人  
(2)妊娠又は妊娠していると思われる人  
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことのある人
2. 使用後の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状                           |
|------|-------------------------------|
| 皮 ふ  | 発疹、発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感 |

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 用法・用量

1日4回を限度として適量を患部に塗布してください。

## &lt;用法・用量に関する注意&gt;

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)11歳以上15歳未満の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)11歳未満の児に使用させないでください。
- (4)目に入らないように注意してください。万一、目にに入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)本剤のついた手で、目などを粘膜にふれないでください。
- (6)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (7)1週間あたり50mLを超えて使用しないでください。
- (8)皮ふの弱い人は、同じところに続けて塗布しないでください。
- (9)本剤を塗った後の患部を通気性の悪いものでおおわないでください。
- (10)入浴前後にご使用になった場合、強い刺激(ヒリヒリする等)を感じることがあります。この場合はすぐに石けん又はぬるま湯で洗い流してください。
- (11)スポンジ面をゆっくり患部に数回押し当てる、スポンジに薬液を十分しみ込ませてから患部に塗布してください。薬液をスポンジ面にしみ込ませないで使用すると、スポンジが破損する場合があります。

鎮痛・消炎剤 Pain Relief Liquid

販売名

ディアトロン

第2類  
医薬品

HapYcom

第2類医薬品

第2類医薬品

インドメタシン  
ローション1.0%

インドメタシンが患部の痛みを緩和

インドメタシン  
ローション1.0%痛みに  
効く 肩こり肩こり  
に伴う肩の痛み  
腰 痛  
関節痛  
ねんざ

対象年齢 11歳以上

内 容 量 80mL

ねんざ



4 956622 110114



使用期限

製造番号

ディアトロンには、非ステロイド性鎮痛消炎成分のインドメタシンを1%配合しております。インドメタシンは、塗布部位への吸収性に優れ、皮膚から肩、腰、関節などの痛みのある部分に直接浸透し、痛みの原因となる物質の生成を抑え、炎症を鎮めてつらい症状に効果を発揮します。I-メントールの配合により、心地よい清涼感があり、痛みをやわらげます。

首の部分が曲がっていて、スポンジがぴったりと接しますので、背中や腰などの塗りにくい患部にもスムーズにむらなく適量を塗布できます。



製造販売元  
ジャパンメティック株式会社  
富山県富山市横越168

お客様相談窓口☎076-438-1107  
受付時間:月~金、9:00~17:00  
(祝日・年末年始を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

MADE IN JAPAN