

デリケートな部位の炎症を抑え、かゆみを鎮めます。

デリケーション

鎮痒消炎薬

こんな症状に

生理時のかゆみ おりものによるかゆみ 陰部周辺部のかゆみ
ナプキン・おりものシート使用時のかぶれ
下着の締め付けによるかゆみ 乾燥肌によるかゆみ あせもなど



〔デリケーションの特徴〕

1. 非ステロイド系、べとつかないさわやかな使用感のクリームタイプのかゆみ止め薬です。
2. かゆみの原因物質をブロックし、不快なかゆみを抑えます。
3. 血流改善作用、抗炎症作用により、皮ふのトラブルを改善します。
4. かゆみや炎症の原因となっている雑菌の繁殖を抑え、皮ふを清潔に保ちます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

※ カンジダ症、トリコモナス症などの原因によるかゆみは、医師による治療が必要です。

〔効能・効果〕

かゆみ、かぶれ、湿疹、皮ふ炎、ただれ、じんましん、あせも、虫さされ、しもやけ

〔用法・用量〕

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 粘膜部分には使用しないでください。

〔成分・分量〕

成 分	含 量 (100g中)	は た ら き
ジフェンヒドラミン	1.0 g	抗ヒスタミン作用でかゆみの原因物質をブロックします。
リドカイン	1.0 g	局所麻酔作用でかゆみを素早く鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5 g	血流改善作用で新陳代謝を促進し、患部の治りを助けます。
グリチルレチン酸	0.2 g	抗炎症作用で皮ふのトラブルを改善します。
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g	殺菌作用で雑菌の繁殖を防ぎます。

添加物として、モノステアリン酸グリセリン、ベヘニルアルコール、パルミチン酸セチル、カルボキシビニルポリマー、パルミチン酸イソプロピル、スクワラン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ジメチルポリシロキサン、1,3-ブチレングリコール、クエン酸を含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限（ケース及びチューブに記載）を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせ

- お買い求めの販売店
- ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107
〔受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9：00～17：00〕

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元

ジャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168