

\*2012年8月改訂

2013年3月（記載要領変更に伴う改訂）

D1

虫さされ・かゆみに

第2類医薬品

# マイゼロックG

鎮痒消炎薬

## マイゼロックGの特徴

- ・ゲルタイプで、スーッとこちよい清涼感を与えます。
- ・かゆみや炎症を抑える成分として、デキサメタゾン酢酸エステル、グリチルレチン酸を配合しています。
- ・かゆみを抑える成分として、l-メントール、dl-カンフルを配合しています。
- ・殺菌作用のある成分として、イソプロピルメチルフェノールを配合しています。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

〈守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〉

1. 次の部位には使用しないでください。
  - (1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
  - (2) 目の周囲、粘膜等
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 長期運用しないでください。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4) 患部が広範囲の人
  - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
皮ふ（患部）	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## \*効能・効果

かゆみ、虫さされ、かぶれ、あせも、じんましん、湿疹、皮ふ炎、しもやけ



## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

### <用法・用量に関する注意>

- (1)定められた用法・用量をお守りください。
- (2)小児に使用せる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)患部を搔かないでください。本剤にはアルコールが含有されているため、塗布した時にしみることがあります。
- (5)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

## 成分・分量

成 分	含量 (100g中)	は た ら き
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	炎症を抑え、はれ・赤み等の症状を改善します。
グリチルレチン酸	0.3g	虫さされなどによる炎症を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	患部に対する殺菌作用があります。
l-メントール	3.0g	鎮痛作用を有し、清涼感のある刺激作用により痛みやかゆみをやわらげます。
dl-カンフル	2.0g	

添加物として、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、ヒプロメロース、イソプロパノール、エタノールを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)使用後は、必ずキャップをきちんと閉めてください。車の中など高温になる場所や、直射日光の当たる場所をさけ、涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のしてある床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6)衣類や寝具に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- (7)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。



### 製品についてのお問い合わせ

- ・お買い求めの販売店
- ・ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107  
〔受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9:00～17:00〕

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元  
**ジャパンメディック株式会社**  
富山県富山市横越168